


龍ヶ崎市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女ともに急性心筋梗塞の死亡率が高く、男性では糖尿病の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。

男性










標準化死亡比	1.00	0.95	1.06	0.87	1.12	0.95	1.61	1.04	1.62	0.92	1.08	0.91	0.95	1.25
死亡数	1774	576	96	63	65	137	34	255	103	142	16	47	79	37
期待死亡数	1766.1	605.6	90.8	72.2	58.0	143.8	21.1	244.5	63.6	153.7	14.8	51.7	83.4	29.6
期待死亡数との差	7.9	-29.6	5.2	-9.2	7.0	-6.8	12.9	10.5	39.4	-11.7	1.2	-4.7	-4.4	7.4
全国に比べて有意に高い							○		○					
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.11	1.03	1.23	0.91	1.01	1.12	1.04	0.87	1.11	1.23	1.98	0.99	1.28	0.76	1.03	0.97
死亡数	1604	391	53	50	27	58	39	15	18	299	87	146	27	28	88	29
期待死亡数	1441.9	380.0	42.9	54.9	26.7	51.7	37.4	17.3	16.2	242.7	43.8	147.0	21.2	36.6	85.3	30.0
期待死亡数との差	162.1	11.0	10.1	-4.9	0.3	6.3	1.6	-2.3	1.8	56.3	43.2	-1.0	5.8	-8.6	2.7	-1.0
全国に比べて有意に高い	○									○	○					
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本21 関連指標の経年度変化(龍ヶ崎市)



取手市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男性では胃がんの死亡率がやや高く、女性では大腸がんと乳がんの死亡率がやや高い。今後も高血圧対策、喫煙対策、がん検診などを推進していくことが重要である。

男性



標準化死亡比	0.94	0.97	1.17	0.93	1.02	0.86	1.03	0.87	0.94	0.98	1.05	0.86	1.00	1.11
死亡数	2751	984	179	112	100	210	36	352	98	249	24	73	142	55
期待死亡数	2920.1	1018.0	153.1	120.4	97.9	243.4	35.1	402.9	104.5	255.2	22.9	84.5	141.3	49.7
期待死亡数との差	-169.1	-34.0	25.9	-8.4	2.1	-33.4	0.9	-50.9	-6.5	-6.2	1.1	-11.5	0.7	5.3
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い	○					○		○						









女性



標準化死亡比	1.02	1.03	1.03	1.21	0.80	0.83	1.28	0.52	1.32	1.06	0.98	0.95	0.78	1.07	0.94	1.02
死亡数	2311	629	71	106	35	70	74	14	34	404	68	220	26	62	125	48
期待死亡数	2266.7	608.3	68.6	87.9	43.7	84.0	57.9	26.8	25.8	380.4	69.4	230.4	33.5	58.0	132.8	47.1
期待死亡数との差	44.3	20.7	2.4	18.1	-8.7	-14.0	16.1	-12.8	8.2	23.6	-1.4	-10.4	-7.5	4.0	-7.8	0.9
全国に比べて有意に高い																
全国に比べて有意に低い								○								

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (取手市)


- 凡例
- 茨城県
 - △ 竜ヶ崎保健所
 - 取手市



牛久市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男性では総死亡率が低い一方、女性では大腸がんの死亡率がやや高い。今後も高血圧対策、喫煙対策、がん検診などを推進していくことが重要である。

男性












標準化死亡比	0.86	0.83	0.84	0.84	0.75	0.73	1.24	0.89	0.91	0.88	1.03	1.08	0.76	0.54
死亡数	1618	542	82	65	47	113	28	230	61	143	16	59	67	17
期待死亡数	1873.7	650.4	97.6	77.4	62.4	154.8	22.5	258.2	67.3	162.3	15.5	54.7	88.1	31.2
期待死亡数との差	-255.7	-108.4	-15.6	-12.4	-15.4	-41.8	5.5	-28.2	-6.3	-19.3	0.5	4.3	-21.1	-14.2
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い	○	○			○	○							○	○

女性



標準化死亡比	1.03	1.01	1.04	1.25	0.97	0.90	0.85	1.23	1.07	0.98	0.85	1.01	1.17	1.14	0.93	0.84
死亡数	1447	390	45	69	26	47	33	22	17	228	36	143	25	41	75	24
期待死亡数	1408.5	384.5	43.1	55.1	26.8	52.4	38.7	17.9	15.9	232.8	42.6	141.6	21.3	35.9	80.6	28.7
期待死亡数との差	38.5	5.5	1.9	13.9	-0.8	-5.4	-5.7	4.1	1.1	-4.8	-6.6	1.4	3.7	5.1	-5.6	-4.7
全国に比べて有意に高い																
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (牛久市)



守谷市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


女性では乳がんの死亡率が高い。がん検診の積極的な推進が求められる。

男性











標準化死亡比	0.86	0.90	0.98	0.84	1.02	0.81	0.43	0.80	0.48	0.83	1.15	0.73	0.85	0.93
死亡数	983	358	58	40	39	76	6	125	20	81	12	25	43	17
期待死亡数	1144.5	396.2	59.3	47.8	38.1	93.4	13.8	157.2	41.6	97.8	10.4	34.2	50.7	18.2
期待死亡数との差	-161.5	-38.2	-1.3	-7.8	0.9	-17.4	-7.8	-32.2	-21.6	-16.8	1.6	-9.2	-7.7	-1.2
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い	○	○				○	○	○	○					

女性



標準化死亡比	0.97	1.06	1.08	1.02	0.75	1.06	1.47	0.84	1.03	0.96	0.50	0.76	0.89	0.90	0.66	0.79
死亡数	854	256	29	35	12	34	38	10	10	139	13	67	12	20	33	14
期待死亡数	882.9	240.7	26.9	34.3	16.0	32.0	25.9	11.9	9.7	144.7	26.2	88.4	13.5	22.3	50.2	17.8
期待死亡数との差	-28.9	15.3	2.1	0.7	-4.0	2.0	12.1	-1.9	0.3	-5.7	-13.2	-21.4	-1.5	-2.3	-17.2	-3.8
全国に比べて有意に高い							○									
全国に比べて有意に低い											○	○			○	


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (守谷市)



稲敷市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも糖尿病と急性心筋梗塞の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および肥満対策が重要である。また、男女とも胃がんの死亡率が高く、男性では肝がんの死亡率が高い。がん検診や肝炎ウイルス検診、腹部超音波検診の積極的な推進が求められる。

男性











標準化死亡比	1.19	1.21	1.30	1.08	1.79	1.12	1.97	1.12	1.76	1.11	1.79	1.17	1.01	1.38
死亡数	1623	543	88	57	76	121	31	215	85	136	18	45	71	34
期待死亡数	1364.7	450.1	67.6	52.9	42.5	107.7	15.7	191.9	48.2	122.0	10.1	38.4	70.6	24.7
期待死亡数との差	258.3	92.9	20.4	4.1	33.5	13.3	15.3	23.1	36.8	14.0	7.9	6.6	0.4	9.3
全国に比べて有意に高い	○	○	○		○		○		○					
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.10	1.03	1.43	1.06	1.23	0.97	0.71	0.74	1.79	0.99	1.54	0.97	1.24	0.86	0.97	0.66
死亡数	1432	315	51	48	28	41	18	9	26	229	62	133	21	28	82	19
期待死亡数	1295.9	305.7	35.7	45.4	22.7	42.5	25.5	12.2	14.6	230.2	40.4	137.3	17.0	32.5	84.2	28.8
期待死亡数との差	136.1	9.3	15.3	2.6	5.3	-1.5	-7.5	-3.2	11.4	-1.2	21.6	-4.3	4.0	-4.5	-2.2	-9.8
全国に比べて有意に高い	○		○						○		○					
全国に比べて有意に低い																○


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (稲敷市)



河内町 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも急性心筋梗塞の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性












標準化死亡比	1.15	1.04	1.32	1.05	1.70	0.83	1.90	1.50	2.93	0.98	0.43	1.01	1.08	0.86
死亡数	366	110	21	13	17	21	7	67	33	28	1	9	18	5
期待死亡数	319.0	105.7	15.9	12.4	10.0	25.3	3.7	44.8	11.3	28.6	2.3	9.0	16.6	5.8
期待死亡数との差	47.0	4.3	5.1	0.6	7.0	-4.3	3.3	22.2	21.7	-0.6	-1.3	0.0	1.4	-0.8
全国に比べて有意に高い	○							○	○					
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.11	0.98	1.47	1.25	1.58	0.29	0.84	1.04	1.64	1.20	2.06	0.92	0.96	0.49	1.12	1.10
死亡数	359	74	13	14	9	3	5	3	6	70	21	32	4	4	24	8
期待死亡数	324.6	75.1	8.8	11.2	5.7	10.5	6.0	2.9	3.7	58.2	10.2	34.6	4.2	8.1	21.4	7.3
期待死亡数との差	34.4	-1.1	4.2	2.8	3.3	-7.5	-1.0	0.1	2.3	11.8	10.8	-2.6	-0.2	-4.1	2.6	0.7
全国に比べて有意に高い											○					
全国に比べて有意に低い						○							○			


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (河内町)



利根町 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


総死亡率は全国並み。今後とも高血圧対策、喫煙対策、がん検診などを推進していくことが重要である。

男性












標準化死亡比	0.93	0.96	1.00	1.27	1.06	0.65	1.10	0.70	0.53	0.93	0.99	1.05	0.78	0.77
死亡数	491	179	28	28	19	29	7	51	10	43	4	16	20	7
期待死亡数	529.3	186.4	28.1	22.1	17.9	44.7	6.4	73.2	19.0	46.2	4.0	15.3	25.8	9.1
期待死亡数との差	-38.3	-7.4	-0.1	5.9	1.1	-15.7	0.6	-22.2	-9.0	-3.2	0.0	0.7	-5.8	-2.1
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い						○		○	○					

女性



標準化死亡比	0.99	0.93	1.24	0.85	1.11	0.63	0.57	0.83	1.01	1.06	1.12	0.89	0.64	1.27	0.76	1.41
死亡数	433	106	16	14	9	10	6	4	5	79	15	40	4	14	20	13
期待死亡数	435.5	113.4	12.9	16.5	8.1	15.8	10.5	4.8	4.9	74.3	13.4	44.8	6.2	11.1	26.4	9.2
期待死亡数との差	-2.5	-7.4	3.1	-2.5	0.9	-5.8	-4.5	-0.8	0.1	4.7	1.6	-4.8	-2.2	2.9	-6.4	3.8
全国に比べて有意に高い																
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (利根町)



土浦市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも急性心筋梗塞の死亡率が高く、男性では脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。また、女性の子宮がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

男性












標準化死亡比	1.02	0.96	0.95	0.99	0.94	0.95	0.88	0.96	1.48	1.11	0.86	1.08	1.17	1.13
死亡数	3683	1156	172	141	107	272	37	482	189	353	24	111	211	72
期待死亡数	3608.5	1203.4	180.7	141.8	114.0	287.4	41.9	503.1	127.6	318.8	27.8	102.3	180.7	63.5
期待死亡数との差	74.5	-47.4	-8.7	-0.8	-7.0	-15.4	-4.9	-21.1	61.4	34.2	-3.8	8.7	30.3	8.5
全国に比べて有意に高い									○				○	
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.07	1.01	0.98	1.05	0.77	1.00	0.94	1.47	1.08	0.93	1.38	1.15	1.38	1.41	1.03	0.97
死亡数	3348	787	88	120	44	108	66	49	38	499	133	371	60	111	199	65
期待死亡数	3121.2	781.6	89.7	114.2	56.8	107.7	70.5	33.3	35.1	538.9	96.1	323.6	43.4	78.9	192.9	67.1
期待死亡数との差	226.8	5.4	-1.7	5.8	-12.8	0.3	-4.5	15.7	2.9	-39.9	36.9	47.4	16.6	32.1	6.1	-2.1
全国に比べて有意に高い	○							○			○	○	○	○		
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（土浦市）



石岡市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも心疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性



標準化死亡比	1.03	0.93	1.10	0.99	0.87	0.88	1.33	1.23	1.12	1.07	1.31	1.12	1.04	0.95
死亡数	2367	705	125	88	62	159	35	399	91	220	22	72	125	40
期待死亡数	2304.8	757.1	113.7	88.7	71.4	181.4	26.4	323.8	81.0	206.1	16.8	64.4	119.8	41.9
期待死亡数との差	62.2	-52.1	11.3	-0.7	-9.4	-22.4	8.6	75.2	10.0	13.9	5.2	7.6	5.2	-1.9
全国に比べて有意に高い								○						
全国に比べて有意に低い		○												









女性



標準化死亡比	1.05	0.93	0.88	0.70	0.88	1.00	0.86	1.20	1.09	1.14	1.13	1.06	1.03	1.05	1.12	0.97
死亡数	2147	455	50	51	32	68	36	24	25	413	72	230	28	54	148	44
期待死亡数	2052.5	490.6	57.0	72.5	36.2	67.9	41.8	20.0	23.0	362.1	63.7	216.2	27.2	51.5	131.8	45.3
期待死亡数との差	94.5	-35.6	-7.0	-21.5	-4.2	0.1	-5.8	4.0	2.0	50.9	8.3	13.8	0.8	2.5	16.2	-1.3
全国に比べて有意に高い	○									○						
全国に比べて有意に低い				○												

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（石岡市）


- 凡例
- 茨城県
 - △ 土浦保健所
 - 石岡市



かすみがうら市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。また、女性では胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

男性



標準化死亡比	1.08	1.01	0.90	1.16	1.15	0.91	0.74	0.99	1.20	1.31	1.36	1.71	1.13	1.13
死亡数	1247	389	52	53	42	84	10	160	49	134	12	56	66	23
期待死亡数	1156.8	385.9	58.0	45.5	36.5	92.2	13.4	161.6	41.0	102.4	8.9	32.8	58.2	20.4
期待死亡数との差	90.2	3.1	-6.0	7.5	5.5	-8.2	-3.4	-1.6	8.0	31.6	3.1	23.2	7.8	2.6
全国に比べて有意に高い	○									○		○		
全国に比べて有意に低い														








女性



標準化死亡比	1.12	1.04	1.50	0.99	0.67	1.06	0.96	1.45	1.14	1.10	0.98	1.42	1.60	1.17	1.51	0.89
死亡数	1147	257	43	36	12	36	21	15	13	197	31	152	22	30	98	20
期待死亡数	1021.9	247.3	28.7	36.4	17.9	34.1	21.8	10.3	11.4	179.1	31.5	107.2	13.7	25.6	65.1	22.4
期待死亡数との差	125.1	9.7	14.3	-0.4	-5.9	1.9	-0.8	4.7	1.6	17.9	-0.5	44.8	8.3	4.4	32.9	-2.4
全国に比べて有意に高い	○		○									○			○	
全国に比べて有意に低い																

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (かすみがうら市)


- 凡例
- 茨城県
 - △ 土浦保健所
 - かすみがうら市



美浦村 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


女性では急性心筋梗塞の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。また、男性のがんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

男性



標準化死亡比	1.21	1.20	1.53	1.33	1.50	1.09	0.62	1.00	1.63	0.77	1.19	0.75	0.75	1.42
死亡数	498	167	32	22	20	36	3	57	24	28	4	9	15	10
期待死亡数	412.1	139.5	20.9	16.5	13.4	33.2	4.9	57.2	14.7	36.2	3.4	11.9	20.0	7.0
期待死亡数との差	85.9	27.5	11.1	5.5	6.6	2.8	-1.9	-0.2	9.3	-8.2	0.6	-2.9	-5.0	3.0
全国に比べて有意に高い	○	○												
全国に比べて有意に低い														









女性



標準化死亡比	1.21	1.01	1.36	0.84	1.07	1.13	0.72	1.80	2.25	0.92	2.39	0.77	1.00	0.56	0.79	1.32
死亡数	429	91	14	11	7	14	6	7	9	56	26	28	5	5	17	10
期待死亡数	353.8	90.0	10.3	13.1	6.5	12.4	8.3	3.9	4.0	60.7	10.9	36.6	5.0	9.0	21.6	7.6
期待死亡数との差	75.2	1.0	3.7	-2.1	0.5	1.6	-2.3	3.1	5.0	-4.7	15.1	-8.6	0.0	-4.0	-4.6	2.4
全国に比べて有意に高い	○										○					
全国に比べて有意に低い																

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (美浦村)


- 凡例
- 茨城県
 - △ 土浦保健所
 - 美浦村



阿見町 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


女性では総死亡率が高い。今後とも高血圧対策、喫煙対策、がん検診などを推進していくことが重要である。

男性












標準化死亡比	0.99	0.99	1.08	1.06	1.24	0.92	1.58	1.02	1.19	0.95	1.77	0.89	0.86	1.42
死亡数	1120	377	62	48	45	84	21	162	48	95	16	29	48	28
期待死亡数	1135.7	382.4	57.4	45.3	36.4	91.1	13.3	158.1	40.5	99.8	9.0	32.6	55.7	19.7
期待死亡数との差	-15.7	-5.4	4.6	2.7	8.6	-7.1	7.7	3.9	7.5	-4.8	7.0	-3.6	-7.7	8.3
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.11	1.07	1.20	1.17	0.92	0.91	0.89	0.76	1.61	0.96	1.15	1.04	0.90	1.34	0.97	1.25
死亡数	1046	259	33	41	16	30	20	8	17	154	33	101	12	32	55	25
期待死亡数	940.7	241.3	27.5	35.1	17.3	33.1	22.6	10.6	10.6	160.5	28.8	96.8	13.4	23.8	57.0	19.9
期待死亡数との差	105.3	17.7	5.5	5.9	-1.3	-3.1	-2.6	-2.6	6.4	-6.5	4.2	4.2	-1.4	8.2	-2.0	5.1
全国に比べて有意に高い	○															
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (阿見町)



つくば市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


女性では心疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性












標準化死亡比	0.99	0.97	1.01	1.09	0.88	1.01	0.96	1.02	0.92	1.06	1.14	0.89	1.14	0.73
死亡数	3999	1290	202	173	111	319	45	574	132	372	39	103	221	50
期待死亡数	4041.5	1332.6	199.3	158.5	126.1	315.5	46.9	560.8	143.4	352.4	34.2	116.2	193.1	68.6
期待死亡数との差	-42.5	-42.6	2.7	14.5	-15.1	3.5	-1.9	13.2	-11.4	19.6	4.8	-13.2	27.9	-18.6
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い														○

女性



標準化死亡比	1.02	0.94	1.02	0.99	0.80	0.84	1.03	0.73	1.06	1.15	0.84	1.01	1.06	0.89	1.05	0.87
死亡数	3577	824	102	126	49	99	86	29	41	691	89	363	52	78	226	65
期待死亡数	3500.8	872.2	99.9	126.8	61.0	117.7	83.7	39.6	38.6	599.6	105.9	360.8	49.0	87.5	214.9	74.4
期待死亡数との差	76.2	-48.2	2.1	-0.8	-12.0	-18.7	2.3	-10.6	2.4	91.4	-16.9	2.2	3.0	-9.5	11.1	-9.4
全国に比べて有意に高い										○						
全国に比べて有意に低い								○								


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(つくば市)



つくばみらい市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


女性では急性心筋梗塞の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性












標準化死亡比	0.96	0.97	1.26	0.91	0.97	0.86	0.84	1.05	1.26	1.16	1.01	1.03	1.29	0.89
死亡数	1074	369	72	41	35	78	11	163	50	113	9	33	70	17
期待死亡数	1116.1	379.4	57.0	44.9	36.2	90.5	13.2	154.6	39.7	97.6	8.9	32.1	54.2	19.1
期待死亡数との差	-42.1	-10.4	15.0	-3.9	-1.2	-12.5	-2.2	8.4	10.3	15.4	0.1	0.9	15.8	-2.1
全国に比べて有意に高い														
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	0.97	0.88	1.01	1.02	0.81	0.73	0.85	0.57	1.12	1.09	1.51	0.80	0.67	0.71	0.90	0.78
死亡数	928	211	28	36	14	24	19	6	12	179	44	79	9	17	53	16
期待死亡数	955.4	240.9	27.6	35.1	17.2	33.1	22.3	10.5	10.7	164.1	29.2	98.7	13.4	24.0	58.7	20.4
期待死亡数との差	-27.4	-29.9	0.4	0.9	-3.2	-9.1	-3.3	-4.5	1.3	14.9	14.8	-19.7	-4.4	-7.0	-5.7	-4.4
全国に比べて有意に高い											○					
全国に比べて有意に低い		○										○				


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(つくばみらい市)



結城市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男性では脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性











標準化死亡比	1.05	0.99	1.10	1.12	0.94	1.06	1.24	0.86	1.02	1.25	1.80	1.17	1.22	1.02
死亡数	1455	456	76	61	41	117	20	167	50	153	19	46	85	25
期待死亡数	1384.3	461.3	69.3	54.4	43.7	110.2	16.1	193.4	49.0	122.6	10.5	39.2	69.8	24.5
期待死亡数との差	70.7	-5.3	6.7	6.6	-2.7	6.8	3.9	-26.4	1.0	30.4	8.5	6.8	15.2	0.5
全国に比べて有意に高い										○				
全国に比べて有意に低い								○						

女性



標準化死亡比	1.08	0.96	1.15	0.91	0.80	0.94	1.03	1.05	1.50	1.02	0.90	1.07	0.98	1.07	1.11	0.66
死亡数	1289	282	39	39	17	38	27	13	20	210	33	133	16	32	83	17
期待死亡数	1188.8	293.1	33.8	43.0	21.2	40.4	26.3	12.4	13.3	206.7	36.6	123.9	16.3	29.9	74.5	25.8
期待死亡数との差	100.2	-11.1	5.2	-4.0	-4.2	-2.4	0.7	0.6	6.7	3.3	-3.6	9.1	-0.3	2.1	8.5	-8.8
全国に比べて有意に高い	○															
全国に比べて有意に低い																○


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（結城市）



筑西市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも心疾患と脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。また、男性の胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

男性



標準化死亡比	1.10	1.00	1.19	1.04	1.17	0.96	1.32	1.16	2.04	1.16	1.88	1.09	1.06	0.85
死亡数	3242	976	174	119	108	223	45	479	213	304	42	91	160	45
期待死亡数	2951.7	975.1	146.4	114.9	92.2	233.0	34.0	414.0	104.3	262.5	22.3	83.3	150.4	52.8
期待死亡数との差	290.3	0.9	27.6	4.1	15.8	-10.0	11.0	65.0	108.7	41.5	19.7	7.7	9.6	-7.8
全国に比べて有意に高い	○		○					○	○	○	○			
全国に比べて有意に低い														








女性



標準化死亡比	1.08	0.98	1.24	1.03	0.74	0.91	0.90	1.26	1.32	1.14	1.82	1.23	1.80	1.21	1.15	1.08
死亡数	2913	641	94	99	35	82	51	34	40	542	152	350	65	82	199	64
期待死亡数	2704.9	651.4	75.6	96.1	47.5	89.9	56.7	26.9	30.3	475.3	83.6	284.3	36.2	67.9	172.8	59.4
期待死亡数との差	208.1	-10.4	18.4	2.9	-12.5	-7.9	-5.7	7.1	9.7	66.7	68.4	65.7	28.8	14.1	26.2	4.6
全国に比べて有意に高い	○									○	○	○	○			
全国に比べて有意に低い					○											

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (筑西市)


- 凡例
- 茨城県
 - △ 筑西保健所
 - 筑西市



桜川市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも急性心筋梗塞と脳血管疾患の死亡率が高く、男性では糖尿病と心疾患の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。

男性












標準化死亡比	1.16	1.09	1.30	1.12	0.95	1.21	1.90	1.23	1.93	1.20	2.36	1.12	1.09	1.26
死亡数	1561	474	85	57	39	126	29	233	91	145	23	42	77	31
期待死亡数	1343.0	435.2	65.4	51.0	40.8	104.2	15.2	189.6	47.2	120.6	9.8	37.4	70.5	24.7
期待死亡数との差	218.0	38.8	19.6	6.0	-1.8	21.8	13.8	43.4	43.8	24.4	13.2	4.6	6.5	6.3
全国に比べて有意に高い	○		○				○	○	○	○	○			
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.06	0.97	1.18	1.06	0.74	0.88	1.03	0.90	1.06	1.06	1.49	1.30	2.15	0.95	1.19	1.15
死亡数	1434	301	43	49	17	38	26	11	16	258	63	188	37	32	107	35
期待死亡数	1356.8	310.2	36.5	46.3	23.0	43.0	25.3	12.2	15.1	243.6	42.2	144.8	17.2	33.8	90.1	30.6
期待死亡数との差	77.2	-9.2	6.5	2.7	-6.0	-5.0	0.7	-1.2	0.9	14.4	20.8	43.2	19.8	-1.8	16.9	4.4
全国に比べて有意に高い	○										○	○	○			
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（桜川市）



下妻市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも脳血管疾患の死亡率が高く、男性では糖尿病、女性では急性心筋梗塞の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。

男性



標準化死亡比	1.14	1.07	1.28	1.32	0.84	1.20	1.80	1.11	1.30	1.32	1.36	1.32	1.34	1.16
死亡数	1317	407	73	59	30	109	24	180	53	136	12	43	79	24
期待死亡数	1158.5	379.9	57.0	44.8	35.9	90.7	13.3	162.6	40.9	103.1	8.8	32.7	59.0	20.7
期待死亡数との差	158.5	27.1	16.0	14.2	-5.9	18.3	10.7	17.4	12.1	32.9	3.2	10.3	20.0	3.3
全国に比べて有意に高い	○						○			○			○	
全国に比べて有意に低い														









女性



標準化死亡比	1.08	0.95	0.77	0.79	0.65	1.05	0.95	1.43	1.49	1.07	1.58	1.39	1.97	1.26	1.33	1.13
死亡数	1166	243	23	30	12	37	21	15	18	205	53	159	28	34	93	27
期待死亡数	1082.2	255.1	29.8	37.8	18.6	35.1	22.0	10.5	12.1	191.5	33.4	114.3	14.2	27.0	70.2	24.0
期待死亡数との差	83.8	-12.1	-6.8	-7.8	-6.6	1.9	-1.0	4.5	5.9	13.5	19.6	44.7	13.8	7.0	22.8	3.0
全国に比べて有意に高い	○										○	○	○		○	
全国に比べて有意に低い																

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（下妻市）


- 凡例
- 茨城県
 - △ 常総保健所
 - 下妻市



常総市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男性では急性心筋梗塞と脳梗塞、女性では脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。また、男女とも胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

男性



標準化死亡比	1.07	1.01	1.29	0.84	0.78	1.06	0.91	1.03	1.30	1.13	0.93	1.01	1.25	1.20
死亡数	1849	576	110	56	42	144	18	250	79	173	12	49	110	37
期待死亡数	1723.7	568.5	85.4	66.9	53.6	135.9	19.8	241.7	60.8	153.4	13.0	48.5	88.1	30.9
期待死亡数との差	125.3	7.5	24.6	-10.9	-11.6	8.1	-1.8	8.3	18.2	19.6	-1.0	0.5	21.9	6.1
全国に比べて有意に高い	○		○						○				○	
全国に比べて有意に低い														









女性



標準化死亡比	1.08	1.01	1.48	1.22	0.61	0.53	0.92	1.28	0.67	1.01	1.23	1.23	1.46	1.12	1.25	1.18
死亡数	1731	384	66	69	17	28	30	20	12	288	61	208	31	45	130	42
期待死亡数	1606.8	381.8	44.5	56.5	28.0	52.8	32.7	15.6	18.0	283.8	49.7	169.5	21.2	40.2	103.7	35.5
期待死亡数との差	124.2	2.2	21.5	12.5	-11.0	-24.8	-2.7	4.4	-6.0	4.2	11.3	38.5	9.8	4.8	26.3	6.5
全国に比べて有意に高い	○		○									○			○	
全国に比べて有意に低い					○	○										

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (常総市)


- 凡例
- 茨城県
 - △ 常総保健所
 - 常総市



坂東市 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性












標準化死亡比	1.13	1.08	1.24	1.09	1.17	1.08	1.35	1.13	1.09	1.27	1.32	1.15	1.34	0.93
死亡数	1661	528	91	63	54	126	23	232	57	165	15	48	99	24
期待死亡数	1469.3	488.7	73.4	57.8	46.3	116.6	17.1	205.6	52.2	130.1	11.4	41.8	73.7	25.9
期待死亡数との差	191.7	39.3	17.6	5.2	7.7	9.4	5.9	26.4	4.8	34.9	3.6	6.2	25.3	-1.9
全国に比べて有意に高い	○									○			○	
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.10	0.96	0.88	1.02	0.71	0.77	0.90	1.22	1.32	1.01	1.11	1.20	1.09	1.08	1.26	0.71
死亡数	1415	301	32	47	16	33	25	16	19	228	44	162	19	35	103	20
期待死亡数	1290.4	313.0	36.2	46.1	22.6	43.0	27.9	13.2	14.4	225.8	39.7	135.2	17.4	32.4	81.9	28.2
期待死亡数との差	124.6	-12.0	-4.2	0.9	-6.6	-10.0	-2.9	2.8	4.6	2.2	4.3	26.8	1.6	2.6	21.1	-8.2
全国に比べて有意に高い	○											○			○	
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (坂東市)



八千代町 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性



標準化死亡比	1.12	1.15	1.39	0.81	0.91	1.25	1.36	0.94	0.96	1.61	1.48	2.27	1.35	1.18
死亡数	730	242	44	20	18	63	10	86	22	94	7	41	46	14
期待死亡数	650.3	210.2	31.6	24.7	19.7	50.3	7.4	91.7	22.8	58.2	4.7	18.1	34.0	11.9
期待死亡数との差	79.7	31.8	12.4	-4.7	-1.7	12.7	2.6	-5.7	-0.8	35.8	2.3	22.9	12.0	2.1
全国に比べて有意に高い	○	○								○		○		
全国に比べて有意に低い														









女性



標準化死亡比	1.10	0.98	0.73	1.16	0.39	0.78	1.10	1.60	1.94	0.87	1.07	1.38	1.29	1.34	1.45	1.04
死亡数	661	137	12	24	4	15	13	9	13	93	20	88	10	20	57	14
期待死亡数	600.6	139.5	16.4	20.7	10.2	19.3	11.8	5.6	6.7	107.0	18.6	63.8	7.8	15.0	39.4	13.4
期待死亡数との差	60.4	-2.5	-4.4	3.3	-6.2	-4.3	1.2	3.4	6.3	-14.0	1.4	24.2	2.2	5.0	17.6	0.6
全国に比べて有意に高い	○											○			○	
全国に比べて有意に低い					○											

年齢調整健康日本21 関連指標の経年度変化(八千代町)


- 凡例
- 茨城県
 - △ 常総保健所
 - 八千代町



古河市 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも脳血管疾患と急性心筋梗塞の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性











標準化死亡比	1.08	1.01	1.11	1.13	0.89	1.07	1.00	1.06	1.75	1.30	1.75	1.32	1.25	1.16
死亡数	3775	1193	197	159	101	300	41	517	218	398	49	133	212	70
期待死亡数	3495.3	1182.6	177.5	140.2	112.9	281.6	41.2	485.8	124.8	306.8	28.1	100.8	170.3	60.1
期待死亡数との差	279.7	10.4	19.5	18.8	-11.9	18.4	-0.2	31.2	93.2	91.2	20.9	32.2	41.7	9.9
全国に比べて有意に高い	○								○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い														

女性



標準化死亡比	1.11	1.04	0.96	1.02	1.09	0.97	1.00	1.13	1.38	1.13	1.82	1.32	1.70	1.46	1.17	1.06
死亡数	3220	771	81	110	58	98	70	37	45	559	161	391	70	107	205	65
期待死亡数	2889.2	741.6	84.5	107.7	53.1	101.5	69.8	32.6	32.5	493.0	88.5	297.3	41.2	73.3	175.0	61.2
期待死亡数との差	330.8	29.4	-3.5	2.3	4.9	-3.5	0.2	4.4	12.5	66.0	72.5	93.7	28.8	33.7	30.0	3.8
全国に比べて有意に高い	○									○	○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い																


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (古河市)



五霞町 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


女性では胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

男性












標準化死亡比	1.19	1.09	1.35	0.40	0.63	1.31	0.69	1.28	1.01	1.24	0.51	1.82	1.08	1.41
死亡数	294	91	17	4	5	26	2	44	9	27	1	13	13	6
期待死亡数	246.6	83.6	12.6	10.0	8.0	19.9	2.9	34.4	8.9	21.7	2.0	7.2	12.0	4.3
期待死亡数との差	47.4	7.4	4.4	-6.0	-3.0	6.1	-0.9	9.6	0.1	5.3	-1.0	5.8	1.0	1.7
全国に比べて有意に高い	○													
全国に比べて有意に低い				○										

女性



標準化死亡比	1.19	0.88	2.21	0.62	0.26	0.67	1.03	0.44	2.36	1.02	0.85	1.16	0.99	0.70	1.43	0.80
死亡数	272	48	14	5	1	5	5	1	6	41	6	28	3	4	21	4
期待死亡数	228.3	54.6	6.3	8.1	3.9	7.5	4.9	2.3	2.5	40.2	7.0	24.1	3.0	5.7	14.7	5.0
期待死亡数との差	43.7	-6.6	7.7	-3.1	-2.9	-2.5	0.1	-1.3	3.5	0.8	-1.0	3.9	0.0	-1.7	6.3	-1.0
全国に比べて有意に高い	○		○													
全国に比べて有意に低い					○											


年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（五霞町）



境町 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男性では脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策が重要である。

男性











標準化死亡比	1.16	1.08	1.38	1.10	1.47	1.15	1.16	0.93	0.84	1.41	0.58	1.26	1.69	0.51
死亡数	782	241	46	29	31	61	9	87	20	84	3	24	57	6
期待死亡数	671.3	222.8	33.4	26.3	21.1	53.2	7.8	94.0	23.8	59.5	5.2	19.1	33.8	11.9
期待死亡数との差	110.7	18.2	12.6	2.7	9.9	7.8	1.2	-7.0	-3.8	24.5	-2.2	4.9	23.2	-5.9
全国に比べて有意に高い	○									○			○	
全国に比べて有意に低い														○

女性



標準化死亡比	1.08	0.90	0.71	0.70	1.42	0.85	0.86	0.99	0.59	0.98	0.80	1.02	0.37	0.66	1.28	0.97
死亡数	656	131	12	15	15	17	11	6	4	105	15	65	3	10	50	13
期待死亡数	608.2	145.8	16.9	21.5	10.6	20.1	12.8	6.1	6.8	106.9	18.8	63.9	8.1	15.2	38.9	13.4
期待死亡数との差	47.8	-14.8	-4.9	-6.5	4.4	-3.1	-1.8	-0.1	-2.8	-1.9	-3.8	1.1	-5.1	-5.2	11.1	-0.4
全国に比べて有意に高い																
全国に比べて有意に低い													○			

年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（境町）




V 市町村別特定健診データ集計結果 (平成26年度, 市町村国保及び国保以外※)

※国保以外・・・県内に所在地を有する市町村国保以外の被用者保険者（全国健康保険協会，共済組合，健康保険組合，国保組合）です。


収縮期血圧の年齢調整平均値(男性)

(mmHg)





収縮期血圧の年齢調整平均値(女性)

(mmHg)





高LDLコレステロールの年齢調整割合(男性)

(160mg/dl以上)



高LDLコレステロールの年齢調整割合(女性)


(160mg/dl以上)



糖尿病型の年齢調整割合(男性)



糖尿病型の年齢調整割合(女性)



平成 29 年 茨城県市町村別健康指標

平成 29 年 3 月

茨城県

茨城県立健康プラザ

(公財) 茨城県総合健診協会

〒310 - 0852 茨城県水戸市笠原町 993 - 2

電話 : 029 - 243 - 4171 FAX : 029 - 243 - 9785

Copyright(C)2017

茨城県. 茨城県立健康プラザ(公財)茨城県総合健診協会. All rights reserved.