




### Ⅲ 死因別標準化死亡比の地域分布 (2010年～2014年)




全死因(男性)



全死因(女性)



悪性新生物(男性)




悪性新生物(女性)


有意性

■ 全国に比べて有意に高い


■ 全国に比べて有意に低い




急性心筋梗塞（男性）



急性心筋梗塞（女性）




脳血管疾患（男性）




脳血管疾患（女性）


有意性  
 全国に比べて有意に高い  
 全国に比べて有意に低い  
 全国に比べて有意に低い




糖尿病(男性)



糖尿病(女性)



腎不全(男性)



腎不全(女性)

有意性

■ 全国に比べて有意に高い


■ 全国に比べて有意に低い

## IV 死亡数及び標準化死亡比, 年齢調整健康日本21関連指標の経年度変化

# 茨城県 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも糖尿病と心疾患、脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および肥満対策が重要である。また、男女とも胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	1.03	0.99	1.13	1.06	0.94	0.95	1.22	1.05	1.44	1.19	1.37	1.18	1.18	1.02
死亡数	79024	25355	4314	3180	2272	5804	1081	11253	3911	8049	809	2557	4539	1375
期待死亡数	76636.5	25509.8	3830.1	3007.4	2417.5	6092.0	889.6	10705.0	2712.4	6785.5	588.5	2173.3	3854.9	1354.3
期待死亡数との差	2387.5	-154.8	483.9	172.6	-145.5	-288.0	191.4	548.0	1198.6	1263.5	220.5	383.7	684.1	20.7
全国に比べて有意に高い	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い					○	○								

## 女性



標準化死亡比	1.06	0.99	1.11	1.01	0.86	0.91	0.94	1.08	1.25	1.08	1.45	1.20	1.24	1.16	1.22	1.00
死亡数	70676	16329	2102	2439	1023	2053	1385	753	938	12528	2982	8350	1130	1956	5136	1443
期待死亡数	66863.7	16451.0	1896.3	2412.8	1193.6	2264.0	1471.2	696.3	749.6	11630.4	2059.6	6973.1	914.7	1683.3	4194.1	1449.9
期待死亡数との差	3812.3	-122.0	205.7	26.2	-170.6	-211.0	-86.2	56.7	188.4	897.6	922.4	1376.9	215.3	272.7	941.9	-6.9
全国に比べて有意に高い	○		○					○	○	○	○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い					○	○	○									




# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化（茨城県）


凡例

● 茨城県


喫煙(男性)




喫煙(女性)




収縮期血圧(男性)




収縮期血圧(女性)




糖代謝(男性)




糖代謝(女性)



LDL(男性)




LDL(女性)



# 水戸保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも糖尿病と急性心筋梗塞、脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および肥満対策が重要である。また、女性では子宮がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	1.03	0.99	1.10	1.05	0.78	0.95	1.50	1.02	1.28	1.38	1.18	1.50	1.35	0.97
死亡数	12782	4047	674	504	301	924	215	1784	563	1534	110	525	865	218
期待死亡数	12461.5	4086.1	613.4	480.1	385.1	977.0	142.9	1748.0	438.6	1110.3	93.5	349.7	639.6	224.2
期待死亡数との差	320.5	-39.1	60.6	23.9	-84.1	-53.0	72.1	36.0	124.4	423.7	16.5	175.3	225.4	-6.2
全国に比べて有意に高い	○		○				○		○	○		○	○	
全国に比べて有意に低い					○									










## 女性



標準化死亡比	1.03	0.99	1.04	1.00	0.86	0.96	0.95	1.26	1.37	0.97	1.27	1.34	1.09	1.28	1.45	1.04
死亡数	11616	2699	328	401	171	362	227	144	173	1913	441	1582	165	362	1036	255
期待死亡数	11260.9	2725.1	315.5	401.0	198.9	375.3	239.1	113.9	126.1	1972.1	347.5	1179.9	151.7	282.8	714.8	246.1
期待死亡数との差	355.1	-26.1	12.5	0.0	-27.9	-13.3	-12.1	30.1	46.9	-59.1	93.5	402.1	13.3	79.2	321.2	8.9
全国に比べて有意に高い	○							○	○		○	○		○	○	
全国に比べて有意に低い					○											




# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(水戸保健所)



# ひたちなか保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも急性心筋梗塞の死亡率が高く、男性では糖尿病の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。また、女性ではがんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	0.95	0.93	1.01	1.16	0.73	0.85	1.54	0.93	1.37	0.96	1.93	0.86	0.90	1.30
死亡数	4329	1414	231	208	106	309	82	584	220	384	70	111	201	102
期待死亡数	4534.6	1521.9	228.5	179.6	144.9	362.7	53.1	629.2	160.8	399.0	36.2	129.7	223.2	78.4
期待死亡数との差	-205.6	-107.9	2.5	28.4	-38.9	-53.7	28.9	-45.2	59.2	-15.0	33.8	-18.7	-22.2	23.6
全国に比べて有意に高い				○			○		○		○			○
全国に比べて有意に低い	○	○			○	○								









## 女性



標準化死亡比	1.02	1.07	1.15	1.19	0.97	0.97	0.88	1.09	1.29	0.99	1.57	1.02	1.30	1.04	0.99	1.06
死亡数	3656	989	121	159	64	123	77	45	52	598	171	375	67	94	211	80
期待死亡数	3577.3	926.4	105.2	134.1	66.3	126.6	87.9	41.4	40.2	606.4	109.2	366.1	51.7	90.7	214.1	75.2
期待死亡数との差	78.7	62.6	15.8	24.9	-2.3	-3.6	-10.9	3.6	11.8	-8.4	61.8	8.9	15.3	3.3	-3.1	4.8
全国に比べて有意に高い		○		○							○					
全国に比べて有意に低い																

# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(ひたちなか保健所)


- 凡例
- 茨城県
  - △ ひたちなか保健所



# 常陸大宮保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも心疾患と脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策および喫煙対策が重要である。

## 男性











標準化死亡比	0.99	0.94	1.05	1.14	0.65	0.90	0.87	1.29	2.09	1.08	1.10	0.98	1.13	0.85
死亡数	6099	1855	310	261	120	428	60	1124	446	603	46	164	376	99
期待死亡数	6140.6	1970.0	296.1	229.2	183.7	474.1	68.8	870.5	213.6	556.3	41.7	167.8	333.1	116.0
期待死亡数との差	-41.6	-115.0	13.9	31.8	-63.7	-46.1	-8.8	253.5	232.4	46.7	4.3	-3.8	42.9	-17.0
全国に比べて有意に高い				○				○	○				○	
全国に比べて有意に低い		○			○	○								

## 女性



標準化死亡比	0.98	0.91	1.04	0.93	0.70	0.86	1.01	0.88	0.91	1.22	1.99	1.14	0.98	1.07	1.21	0.78
死亡数	5624	1185	160	181	68	155	104	44	58	1264	356	697	71	153	462	101
期待死亡数	5725.1	1299.1	153.3	194.4	97.2	180.9	103.3	50.0	64.0	1032.0	178.7	612.5	72.1	142.7	382.0	129.6
期待死亡数との差	-101.1	-114.1	6.7	-13.4	-29.2	-25.9	0.7	-6.0	-6.0	232.0	177.3	84.5	-1.1	10.3	80.0	-28.6
全国に比べて有意に高い										○	○	○			○	
全国に比べて有意に低い		○			○	○										○


# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (常陸大宮保健所)



# 日立保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも心疾患と脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策および喫煙対策が重要である。また、男女とも胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	死亡数	期待死亡数	期待死亡数との差	全国に比べて有意に高い	全国に比べて有意に低い
1.00	7597	7605.5	-8.5		
0.98	2493	2544.6	-51.6		
1.16	445	382.6	62.4	○	
1.04	311	298.7	12.3		
0.89	216	241.8	-25.8		
0.86	525	609.2	-84.2		○
0.79	70	88.5	-18.5		○
1.04	1105	1061.3	43.7		
1.55	415	268.5	146.5	○	
1.23	834	675.7	158.3	○	
1.15	65	56.8	8.2		
1.42	304	214.7	89.3	○	
1.17	454	387.5	66.5	○	
0.98	133	135.5	-2.5		










## 女性



標準化死亡比	死亡数	期待死亡数	期待死亡数との差	全国に比べて有意に高い	全国に比べて有意に低い
1.09	7174	6562.0	612.0	○	
1.01	1640	1616.6	23.4		
1.21	225	186.5	38.5	○	
1.03	244	237.4	6.6		
0.86	102	119.1	-17.1		
0.86	192	223.9	-31.9		○
0.90	127	141.1	-14.1		
1.08	72	67.0	5.0		
1.19	88	74.1	13.9		
1.19	1356	1144.1	211.9	○	
1.70	346	203.3	142.7	○	
1.30	888	685.6	202.4	○	
1.22	109	89.7	19.3		
1.45	241	165.8	75.2	○	
1.27	524	412.3	111.7	○	
1.11	158	142.8	15.2		




# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(日立保健所)



# 銚田保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも急性心筋梗塞と脳血管疾患の死亡率が高く、男性では糖尿病の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。また、男性では胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性












標準化死亡比	1.09	1.02	1.18	0.94	0.99	0.95	1.78	1.06	1.84	1.46	3.26	1.29	1.33	0.98
死亡数	3085	938	163	101	85	209	57	421	182	371	65	101	199	51
期待死亡数	2819.1	915.9	137.6	107.1	85.9	219.8	32.0	397.9	98.7	253.6	19.9	78.1	149.3	52.1
期待死亡数との差	265.9	22.1	25.4	-6.1	-0.9	-10.8	25.0	23.1	83.3	117.4	45.1	22.9	49.7	-1.1
全国に比べて有意に高い	○		○				○		○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い														

## 女性



標準化死亡比	1.07	0.94	1.28	0.99	0.66	0.87	0.79	0.68	1.22	1.12	1.96	1.36	1.76	1.14	1.40	1.07
死亡数	2817	569	91	89	30	73	39	16	36	527	160	379	59	75	242	63
期待死亡数	2623.6	605.6	71.2	90.3	45.2	84.2	49.1	23.7	29.4	469.8	81.8	279.4	33.6	65.6	173.0	58.9
期待死亡数との差	193.4	-36.6	19.8	-1.3	-15.2	-11.2	-10.1	-7.7	6.6	57.2	78.2	99.6	25.4	9.4	69.0	4.1
全国に比べて有意に高い	○		○							○	○	○	○		○	
全国に比べて有意に低い					○											


# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(銚田保健所)



# 潮来保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも心疾患と脳血管疾患の死亡率が高く、女性では糖尿病の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および女性の肥満対策が重要である。また、男性ではがんの死亡率が高く、がん検診や肝炎ウイルス検診、腹部超音波検診の積極的な推進が求められる。

## 男性












標準化死亡比	1.14	1.14	1.40	1.28	1.35	1.07	1.27	1.13	1.82	1.36	1.48	1.08	1.53	1.09
死亡数	4872	1679	309	224	190	375	65	668	280	507	53	135	310	78
期待死亡数	4288.4	1470.7	220.7	175.3	141.2	349.1	51.2	592.9	154.2	373.1	35.8	125.3	202.6	71.8
期待死亡数との差	583.6	208.3	88.3	48.7	48.8	25.9	13.8	75.1	125.8	133.9	17.2	9.7	107.4	6.2
全国に比べて有意に高い	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	
全国に比べて有意に低い														

## 女性



標準化死亡比	1.12	1.05	1.20	0.91	1.16	0.91	0.74	1.34	1.68	1.17	1.57	1.51	1.37	1.18	1.73	1.13
死亡数	3970	963	125	121	76	115	65	55	67	704	170	552	70	106	370	85
期待死亡数	3556.5	920.3	104.6	133.4	65.5	125.7	87.7	41.0	40.0	603.9	108.6	364.6	51.2	90.2	213.7	74.9
期待死亡数との差	413.5	42.7	20.4	-12.4	10.5	-10.7	-22.7	14.0	27.0	100.1	61.4	187.4	18.8	15.8	156.3	10.1
全国に比べて有意に高い	○								○	○	○	○	○		○	
全国に比べて有意に低い							○									


# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(潮来保健所)



# 竜ヶ崎保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも糖尿病と急性心筋梗塞の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および肥満対策が重要である。また、男女とも胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	0.97	0.96	1.08	0.93	1.11	0.87	1.26	0.94	1.15	0.95	1.14	0.95	0.92	1.02
死亡数	9606	3292	552	378	363	707	149	1295	410	822	91	274	440	172
期待死亡数	9917.4	3412.3	512.5	405.1	326.8	813.1	118.2	1372.9	355.4	865.8	80.0	287.7	476.4	168.4
期待死亡数との差	-311.4	-120.3	39.5	-27.1	36.2	-106.1	30.8	-77.9	54.6	-43.8	11.0	-13.7	-36.4	3.6
全国に比べて有意に高い							○		○					
全国に比べて有意に低い	○	○				○		○						










## 女性



標準化死亡比	1.05	1.03	1.16	1.10	0.98	0.91	1.05	0.82	1.28	1.06	1.23	0.95	1.02	0.96	0.93	0.92
死亡数	8440	2161	278	336	146	263	213	77	116	1448	302	781	119	197	447	155
期待死亡数	8056.0	2107.8	239.0	305.3	149.7	288.8	201.9	93.8	90.7	1363.4	246.0	824.1	116.9	204.6	480.9	169.0
期待死亡数との差	384.0	53.2	39.0	30.7	-3.7	-25.8	11.1	-16.8	25.3	84.6	56.0	-43.1	2.1	-7.6	-33.9	-14.0
全国に比べて有意に高い	○		○						○	○	○					
全国に比べて有意に低い																




# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化 (竜ヶ崎保健所)



# 土浦保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも急性心筋梗塞と脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。また、女性では子宮がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性












標準化死亡比	1.03	0.97	1.03	1.04	1.02	0.93	1.06	1.05	1.32	1.09	1.18	1.14	1.07	1.13
死亡数	8915	2794	443	352	276	635	106	1260	401	830	78	277	465	173
期待死亡数	8617.9	2868.3	430.7	338.0	271.7	685.3	100.0	1203.9	304.8	763.2	65.9	244.0	434.3	152.5
期待死亡数との差	297.1	-74.3	12.3	14.0	4.3	-50.3	6.0	56.1	96.2	66.8	12.1	33.0	30.7	20.5
全国に比べて有意に高い	○								○	○		○		
全国に比べて有意に低い						○								

## 女性



標準化死亡比	1.08	1.00	1.07	0.95	0.82	1.00	0.90	1.32	1.21	1.01	1.28	1.13	1.24	1.23	1.10	1.01
死亡数	8117	1849	228	259	111	256	149	103	102	1319	295	882	127	232	517	164
期待死亡数	7490.1	1850.9	213.2	271.3	134.8	255.2	164.9	78.1	84.2	1301.3	231.0	780.4	102.8	188.9	468.4	162.2
期待死亡数との差	626.9	-1.9	14.8	-12.3	-23.8	0.8	-15.9	24.9	17.8	17.7	64.0	101.6	24.2	43.1	48.6	1.8
全国に比べて有意に高い	○							○			○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い					○											


# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(土浦保健所)



# つくば保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男性では脳梗塞の死亡率が高く、女性では心疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策および喫煙対策が重要である。

## 男性












標準化死亡比	0.98	0.97	1.07	1.05	0.90	0.98	0.93	1.03	0.99	1.08	1.12	0.92	1.18	0.76
死亡数	5073	1659	274	214	146	397	56	737	182	485	48	136	291	67
期待死亡数	5157.6	1711.9	256.3	203.4	162.3	406.0	60.1	715.4	183.1	450.0	43.0	148.3	247.4	87.7
期待死亡数との差	-84.6	-52.9	17.7	10.6	-16.3	-9.0	-4.1	21.6	-1.1	35.0	5.0	-12.3	43.6	-20.7
全国に比べて有意に高い													○	
全国に比べて有意に低い														○

## 女性



標準化死亡比	1.01	0.93	1.02	1.00	0.81	0.82	0.99	0.70	1.07	1.14	0.98	0.96	0.98	0.85	1.02	0.85
死亡数	4456.2	1035	130	162	63	123	105	35	53	870	133	442	61	95	279	81
期待死亡数	4456.2	1113.1	127.5	161.9	78.2	150.8	106.0	50.1	49.3	763.6	135.1	459.4	62.4	111.5	273.5	94.8
期待死亡数との差	48.8	-78.1	2.5	0.1	-15.2	-27.8	-1.0	-15.1	3.7	106.4	-2.1	-17.4	-1.4	-16.5	5.5	-13.8
全国に比べて有意に高い										○						
全国に比べて有意に低い		○				○		○								


# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(つくば保健所)



# 筑西保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも糖尿病と心疾患、脳血管疾患の死亡率が高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および肥満対策が重要である。また、男性では胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	1.10	1.02	1.19	1.08	1.06	1.04	1.44	1.10	1.77	1.19	1.97	1.12	1.11	0.99
死亡数	6258	1906	335	237	188	466	94	879	354	602	84	179	322	101
期待死亡数	5679.0	1871.7	281.1	220.3	176.7	447.5	65.4	797.0	200.5	505.7	42.6	159.9	290.7	102.0
期待死亡数との差	579.0	34.3	53.9	16.7	11.3	18.5	28.6	82.0	153.5	96.3	41.4	19.1	31.3	-1.0
全国に比べて有意に高い	○		○				○	○	○	○	○			
全国に比べて有意に低い														










## 女性



標準化死亡比	1.07	0.98	1.21	1.01	0.75	0.91	0.96	1.13	1.29	1.09	1.53	1.21	1.69	1.11	1.15	1.00
死亡数	5636	1224	176	187	69	158	104	58	76	1010	248	671	118	146	389	116
期待死亡数	5250.5	1254.7	145.9	185.4	91.7	173.3	108.3	51.5	58.7	925.6	162.5	553.0	69.7	131.6	337.4	115.7
期待死亡数との差	385.5	-30.7	30.1	1.6	-22.7	-15.3	-4.3	6.5	17.3	84.4	85.5	118.0	48.3	14.4	51.6	0.3
全国に比べて有意に高い	○		○						○	○	○	○	○		○	
全国に比べて有意に低い					○											




# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(筑西保健所)



# 常総保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010～2014)


男女とも急性心筋梗塞、脳血管疾患の死亡率が、男性では糖尿病の死亡率も高い。より一層の高血圧対策、喫煙対策および男性の肥満対策が重要である。また、男性では胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	1.11	1.06	1.29	1.02	0.93	1.12	1.30	1.07	1.19	1.28	1.21	1.28	1.31	1.11
死亡数	5557	1753	318	198	144	442	75	748	211	568	46	181	334	99
期待死亡数	5001.7	1647.4	247.3	194.1	155.5	393.5	57.6	701.6	176.7	444.7	37.9	141.1	254.7	89.5
期待死亡数との差	555.3	105.6	70.7	3.9	-11.5	48.5	17.4	46.4	34.3	123.3	8.1	39.9	79.3	9.5
全国に比べて有意に高い	○	○	○			○	○		○	○		○	○	
全国に比べて有意に低い														









## 女性



標準化死亡比	1.09	0.98	1.05	1.06	0.62	0.75	0.94	1.34	1.21	1.01	1.26	1.28	1.45	1.17	1.30	1.02
死亡数	4973	1065	133	170	49	113	89	60	62	814	178	617	88	134	383	103
期待死亡数	4579.9	1089.4	126.8	161.0	79.3	150.2	94.3	44.9	51.1	808.2	141.5	482.8	60.6	114.6	295.2	101.0
期待死亡数との差	393.1	-24.4	6.2	9.0	-30.3	-37.2	-5.3	15.1	10.9	5.8	36.5	134.2	27.4	19.4	87.8	2.0
全国に比べて有意に高い	○										○	○	○		○	
全国に比べて有意に低い					○	○										

# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(常総保健所)


- 凡例
- 茨城県
  - △ 常総保健所



# 古河保健所 死亡数及び標準化死亡比 (2010~2014)


男女とも急性心筋梗塞と脳血管疾患の死亡率が高く、女性では心疾患の死亡率も高い。より一層の高血圧対策および喫煙対策が重要である。また、男性では胃がんの死亡率が高く、がん検診の積極的な推進が求められる。

## 男性



標準化死亡比	1.10	1.02	1.16	1.09	0.97	1.09	1.00	1.05	1.57	1.31	1.50	1.34	1.31	1.08
死亡数	4851	1525	260	192	137	387	52	648	247	509	53	170	282	82
期待死亡数	4413.2	1489.1	223.5	176.5	141.9	354.6	51.9	614.3	157.5	388.0	35.2	127.0	216.1	76.2
期待死亡数との差	437.8	35.9	36.5	15.5	-4.9	32.4	0.1	33.7	89.5	121.0	17.8	43.0	65.9	5.8
全国に比べて有意に高い	○		○						○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い														

## 女性



標準化死亡比	1.11	1.01	0.99	0.95	1.09	0.93	0.98	1.07	1.31	1.10	1.59	1.26	1.45	1.28	1.21	1.03
死亡数	4148	950	107	130	74	120	86	44	55	705	182	484	76	121	276	82
期待死亡数	3725.6	942.1	107.7	137.3	67.6	129.1	87.4	41.0	41.8	640.1	114.3	385.2	52.4	94.2	228.6	79.6
期待死亡数との差	422.4	7.9	-0.7	-7.3	6.4	-9.1	-1.4	3.0	13.2	64.9	67.7	98.8	23.6	26.8	47.4	2.4
全国に比べて有意に高い	○									○	○	○	○	○	○	
全国に比べて有意に低い																

# 年齢調整健康日本 21 関連指標の経年度変化(古河保健所)

