


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2018年1月29日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°42'
 E 141°08'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	29.3	309.5	18
2	m	30.8	337.8	15
3	m	30.2	296.1	17
4	m	30.8	292.9	10
5	m	29.9	288.3	14
6	m	29.5	291.8	13
7	m	30.4	309.2	13
8	m	25.3	139.5	6
9	m	28.6	251.9	10
10	m	31.2	385.7	22
11	m	33.9	444.3	17
12	m	27.1	181.6	5
13	m	30.4	332.8	21
14	m	29.7	284.6	11
15	m	30.9	327.4	20
16	m	29.6	273.0	11
17	m	29.1	275.5	13
18	m	29.5	255.2	9
19	m	32.1	360.8	13
20	m	30.1	332.2	18
21	m	29.5	289.6	14
22	m	29.9	267.3	8
23	m	29.6	328.1	21
24	m	25.5	159.4	7
25	m	26.8	176.0	7
26	m	25.7	166.0	9
27	m	26.1	166.3	5
28	m	24.5	136.8	6
29	m	28.4	216.1	7
30	m	25.7	174.7	9

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

