

コウリンカ

Tephrosieris flammea (Turcz. ex DC.) Holub subsp. *glabrifolia* (Cufod.) B.Nord.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II類 (VU)

分 布 本州／朝鮮

生 育 地 日当たりのよい山地の適湿な草原に生える。
北茨城市，高萩市，常陸太田市，大子町に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



八溝山（中崎）

コバノヒルムシロ

Potamogeton cristatus Regel et Maack

ヒルムシロ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II類 (VU)

分 布 本州／朝鮮・中国

生 育 地 池沼に生える。常陸太田市の溜池に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，溜池の埋立

そ の 他 改修工事により出現することがある。



常陸太田市（村上）

フトヒルムシロ

Potamogeton fryeri A.Benn.

ヒルムシロ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・千島

生 育 地 池沼に生える。常陸太田市の溜池に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，溜池の埋立

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現狀不明種

ムサシモ

Najas ancistrocarpa A. Braun ex Magnus

イバラモ科

- 茨城県2012 絶滅危惧 I A類
茨城県1997 危急種
環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

- 分 布 本州・四国
生 育 地 浅い水中に生える。下妻市に生育する。
選 定 理 由 湖岸・溜池の埋立，水質の汚濁
そ の 他



(県博収蔵標本：下妻市産)

ギョウジャニンニク

Allium victorialis L. subsp. *platyphyllum* Hulten

ユリ科

- 茨城県2012 絶滅危惧 I A類
茨城県1997 危急種
環境省2012

- 分 布 北海道・本州（近畿地方以北）／千島・樺太・朝鮮・中国・カムチャツカ・アムール・シベリア東部
生 育 地 深山の林下にしばしば群生する。大子町に生育する。
選 定 理 由 生育地点や個体数が少ない，森林の伐採
そ の 他



大子町（内山）

ステゴビル

Caloscordum inutile (Makino) Okuyama et Kitag.

ユリ科

- 茨城県2012 絶滅危惧 I A類
茨城県1997 絶滅危惧種
環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

- 分 布 本州（茨城県・愛知県・岐阜県・京都府）[日本固有種]
生 育 地 原野に生える。大子町に生育する。
選 定 理 由 生育地点が少ない，農薬の使用
そ の 他



大子町（内山）

ヒメアマナ

Gagea japonica Pascher

ユリ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 北海道・本州・九州 [日本固有種]

生 育 地 河川敷など湿った原野に生える。常総市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，河川の改修，遷移の進行

そ の 他



常総市 (内山)

ヒナザサ

Coelachne japonica Hack.

イネ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・九州 [日本固有種]

生 育 地 湿地に生える。北茨城市，笠間市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市 (内山)

カリヤスモドキ

Miscanthus oligostachyus Stapf

イネ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地に生える。北茨城市，八溝山に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，遷移の進行，登山者による踏みつけ

そ の 他 県内の比較的低標高の産地は貴重な生育地である。



八溝山 (中崎)

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

マイヅルテンナンショウ

Arisaema heterophyllum Blume

サトイモ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II類 (VU)

分 布 本州（岩手県～岡山県）・四国・九州／朝鮮（南部）・中国・台湾

生 育 地 河川敷など低地の草地に生える。つくば市、常総市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，河川の改修

そ の 他



常総市（内山）

カドハリイ

Eleocharis tetraquetra Nees var. *tsurumachii* (Ohwi) Ohwi

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 I A類 (CR)

分 布 本州（茨城県霞ヶ浦）〔日本固有種〕

生 育 地 湿地に生える。稲敷市の霞ヶ浦湖畔のヨシ原に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他 行方市はタイプロカリティである（91）。発見地の行方市では絶滅した。



稲敷市（内山）

ヒナラン

Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 本州（茨城県北部・愛知県以西）・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 樹林下の岩上などに生える。久慈山地などに生育するが，まれに低地の東海村にも生育する。

選 定 理 由 園芸採取，森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

コアツモリソウ

Cypripedium debile Rchb.f.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道 (西南部)・本州 (中北部)・四国 (高知県)・九州 (熊本県) / 中国

生 育 地 山地の樹林下に生える。加波山, 筑波山, 鍋足山の山地に生育する。

選 定 理 由 園芸採取, 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市 (内山)

クマガイソウ

Cypripedium japonicum Thunb.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 北海道 (西南部)・本州・四国・九州 / 朝鮮・中国

生 育 地 山地や平地の樹林下, 特にスギ林, 竹林下にしばしば群生する。取手市, 牛久市などに生育する。

選 定 理 由 園芸採取, 森林の伐採

そ の 他 県内各地に見られたが, 最近は急激に減少している。



水戸市産栽培 (内山)

ヒタチクマガイソウ

Cypripedium japonicum Thunb. var. *glabrum* Mas.Suzuki

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州 (茨城県)

生 育 地 山地林下に生える。城里町, 仏頂山, 吾国山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない, 園芸採取, 森林の伐採

そ の 他 クマガイソウの花茎や茎に毛を欠く品種である (113)。



(県博収蔵標本: 笠間市産)

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II 類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

オオミズトンボ (サワトンボ)

Habenaria linearifolia Maxim.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 北海道・本州（関東地方以北）／ウスリー・アムール・中国（東北部）

生 育 地 日当たりのよい湿原に生える。北茨城市、日立市、笠間市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他

スズムシソウ

Liparis makinoana Schltr.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山地の樹林下に生える。大子町，常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 園芸採取，森林の伐採

そ の 他



(県博収蔵標本：竜神峡産)

フウラン

Neofinetia falcata (Thunb.) Hu

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（関東地方南部以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・中国

生 育 地 常緑樹林内の樹幹や岩石上に着生する。鹿嶋市や神栖市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，園芸採取，森林の伐採

そ の 他



神栖市（内山）

サギソウ

Pecteilis radiata (Thunb.) Raf.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A 類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・台湾

生 育 地 低地の湿地に生育する。高萩市などに生育する。

選 定 理 由 園芸採取, 湿地の開発, 遷移の進行

そ の 他



高萩市 (内山)

ウチョウラン

Ponerorchis graminifolia Rchb.f.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I A 類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州 (関東地方以西)・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山地の湿った岩壁などに生える。大子町, 常陸大宮市, 常陸太田市, 筑波山などに生育する。

選 定 理 由 園芸採取

そ の 他



常陸太田市 (内山)

絶滅

絶滅危惧 I A 類

絶滅危惧 I B 類

絶滅危惧 II 類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種