

シロイヌノヒゲ

Eriocaulon sikokianum Maxim.

ホシクサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 平地の湿地や山地の沢筋などに生える。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



小美玉市（内山）

アイアシ

Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi

イネ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 主に河口や海岸に生える。水戸市，茨城町などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



大洗町（内山）

ウキシバ

Pseudoraphis ukishiba Ohwi

イネ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 湿地や溜池などに生える。土浦市，水戸市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，湖岸の埋立

そ の 他



五霞町（丸山）

フクロダガヤ

Tripogon longearistatus Honda

イネ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 本州（関東北部）〔日本固有種〕

生 育 地 山地の岩上に生える。久慈山地に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない

そ の 他 和名は袋田で発見されたことによる。



常陸太田市（内山）

ヒトツバテンナンショウ

Arisaema monophyllum Nakai

サトイモ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（中北部）〔日本固有種〕

生 育 地 山地のやや湿り気のある暗い林下や、林縁などの斜面に生える。北茨城市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ムサシアブミ

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

サトイモ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／朝鮮南部・中国（本土・台湾）

生 育 地 海岸近くのやや湿った林下に生える。東海村に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



東海村（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヒメミクリ

Sparganium subglobosum Morong

ミクリ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／朝鮮・中国（北部）

生 育 地 溜池などに生える。北茨城市，高萩市，笠間市に生育する。

選 定 理 由 溜池の埋立

そ の 他



笠間市（内山）

ヌマアゼスゲ

Carex cinerascens Kuk.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（関東・東北地方）／朝鮮

生 育 地 平地の湖沼や川岸の湿地に生える。稲敷市のヨシ原や古河市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



稲敷市（内山）

オキナワジュズスゲ

Carex ischnostachya Steud. var. *fastigiata* T.Koyama

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東南部以西・伊豆諸島）・四国・九州・琉球 [日本固有種]

生 育 地 暖地の林下や林縁などに生える。鹿嶋市や神栖市のスダジイの混じる林下に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



神栖市（安）

アサマスゲ

Carex lithophila Turcz.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (長野県・関東地方) / 朝鮮~シベリア
東部

生 育 地 平地の湖沼や川岸の湿地に生える。行方市、
神栖市、稲敷市のヨシ原などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発, 遷移の進行

そ の 他



稲敷市 (内山)

ヌマクロボスゲ

Carex meyeriana Kunth

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州 (中北部)・九州 / 朝鮮・中国 (東北)・
シベリア東部

生 育 地 平地の湖沼や川岸の湿地に生える。水戸市、
稲敷市のヨシ原に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない, 湿地の開発, 遷移の進行

そ の 他



稲敷市 (内山)

キシウナキリスゲ

Carex nachiana Ohwi

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州・四国・九州 / 中国

生 育 地 暖地の林下や林縁に生える。行方市、鹿嶋市
などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない, 森林の伐採

そ の 他



鹿嶋市 (内山)

絶
滅

絶
滅
危
惧
I
A
類

絶
滅
危
惧
I
B
類

絶
滅
危
惧
II
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①注
目
種

情
報
不
足
②現
状
不
明
種

エゾツリスゲ

Carex papulosa Boott

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州(中部以北)・九州／朝鮮・ウスリー

生 育 地 湿地に生える。高萩市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



高萩市(内山)

オオクグ

Carex rugulosa Kuk.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・九州／朝鮮・中国(東北)・ウスリー

生 育 地 海水の出入りする汽水域の湖岸などに生える。日立市，茨城町，神栖市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：銚田市産)

ヒトモトススキ

Cladium jamaicense Crantz subsp. *chinense* (Nees) T.Koyama

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州(関東地方・能登半島以西)・四国・九州・琉球／朝鮮南部・中国・マレーシア・オーストラリア

生 育 地 主に海岸近くの湿り気のある草地に生える。ひたちなか市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，海岸の開発

そ の 他



ひたちなか市(内山)

マシカクイ

Eleocharis tetraquetra Nees

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／中国（本土・台湾）・
インド・インドネシア・オーストラリア

生 育 地 湿地や溜池などの水辺に生える。稲敷市のヨ
シ原に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：稲敷市産)

サギスゲ

Eriophorum gracile K.Koch

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州／北半球

生 育 地 平地から山地の湿地に生える。北茨城市，高
萩市，常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



高萩市（内山）

トネテンツキ

Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch. var. *tonensis* (Makino) Ohwi ex T.Koyama

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（関西以東）〔日本固有種〕

生 育 地 湿地や畦などに生える。稲敷市，古河市，坂
東市の利根川周辺に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，河川の改修，湿地の開発

そ の 他



(県博収蔵標本：菅生沼産)

絶
滅

絶
滅
危
惧
I
A
類

絶
滅
危
惧
I
B
類

絶
滅
危
惧
II
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①注
目
種

情
報
不
足
②現
状
不
明
種

シラン

Bletilla striata (Thunb.) Rehb.f.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州中南部・四国・九州・琉球／中国（本土・台湾）

生 育 地 山野の日当たりがよく、湿り気のある斜面などに生える。高萩市，東海村，鹿嶋市などに生育する。

選 定 理 由 園芸採取，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他 野生状態のものも本来の自生個体かどうか判別は難しい。



高萩市（内山）

キンセイラン

Calanthe nipponica Makino

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 北海道・本州・四国・九州（宮崎県）

生 育 地 山地の安定した林下や林縁に生える。常陸太田市，大子町，城里町などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ベニシュスラン

Goodyera biflora (Lindl.) Hook.f.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山野の林下や湿り気が多い谷筋などの斜面に生える。北茨城市，常陸大宮市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：北茨城市産）

アケボノシュスラン

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. *maximowicziana* (Makino) F.Maek.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 南千島・北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山野の安定した林のやや湿り気のある林下に生える。東海村，常陸大宮市，笠間市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

ミズトンボ

Habenaria sagittifera Rehb.f.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 北海道（西南部）・本州・四国・九州／中国（中部）

生 育 地 山野の日当たりのよい湿地に生える。北茨城市，高萩市，常陸太田市，笠間市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市（内山）

ホクリクムヨウラン

Lecanorchis japonica Blume var. *hokurikuensis* (Masam.) T.Hashim.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（北陸地方・東北地方南部）／中国（中部）
[日本固有種]

生 育 地 常緑広葉樹林下に生える。常陸大宮市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：鹿嶋市産）

絶滅

絶滅危惧 I A 類

絶滅危惧 I B 類

絶滅危惧 II 類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ウスギムヨウラン

Lecanorchis kiusiana Tuyama

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国・九州／朝鮮 [日本固有種]

生 育 地 常緑広葉樹林下に生える。笠間市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



笠間市 (内山)

クロムヨウラン

Lecanorchis nigricans Honda

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州 (伊豆七島・東海地方・紀伊半島)・四国・九州

生 育 地 常緑広葉樹林やマツ林などの林下に生える。日立市や石岡市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



石岡市 (内山)

ギボウシラン

Liparis auriculata Blume ex Miq.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 北海道・本州・四国・九州・屋久島／朝鮮 (済州島)

生 育 地 常緑広葉樹林下に生えるとされるが，北茨城市，常陸太田市では落葉広葉樹林の湿った沢筋に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (内山)

コケイラン

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／カムチャッカ・樺太・朝鮮・ウスリー・中国（本土・東北）

生 育 地 山地のやや湿った林下に生える。八溝山，北茨城市，御前山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

マイサギソウ

Platanthera mandarinorum Rehb.f. subsp. *mandarinorum* var. *neglecta* (Schltr.) F.Maek. ex K.Inoue

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道（南部）・本州（中北部）

生 育 地 山野の明るい草地などに生える。筑波山，男体山に生育する。

選 定 理 由 個体数が少ない，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



筑波山（内山）

トキシソウ

Pogonia japonica Rehb.f.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 北海道・本州・四国・九州／千島・朝鮮・中国

生 育 地 山野の日当たりのよい湿地に生える。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 園芸採取，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



北茨城市（内山）

ヤマトキソウ

Pogonia minor (Makino) Makino

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・台湾・中国

生 育 地 山野の丘陵で日当たりのよい草地などに生える。高萩市，常陸太田市，水戸市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

マツラン

Saccolabium matsuran Makino

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（宮城県以南の太平洋側）・四国・九州

生 育 地 常緑広葉樹林内の樹幹に着生する。笠間市，東海村，鹿嶋市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点や個体数が少ない，森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：鹿嶋市産）

モミラン

Saccolabium toramanum Makino

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（福島県以南）・四国

生 育 地 針葉樹と広葉樹の混交林などの樹幹に着生する。竜神峡に生育する。

選 定 理 由 生育地点や個体数が少ない，森林の伐採

そ の 他



（中崎所蔵標本：竜神峡産）

クモラン

Taeniophyllum glandulosum Blume

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州（福島県以南）・四国・九州・琉球／朝鮮・
中国（本土・台湾）・ヒマラヤ・マレーシア

生 育 地 日当たりのよい樹幹に着生する。北茨城市、
城里町、笠間市、鹿嶋市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点や個体数が少ない、森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種