

準絶滅危惧

エゾノヒメクラマゴケ

Selaginella helvetica (L.) Spring

イワヒバ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州（静岡県・長野県以北）・滋賀県伊吹山・京都府青葉山・鳥取県大山

生 育 地 高山の草原に生える。県内では久慈山地の岩上に生育している。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

カタヒバ

Selaginella involvens (Sw.) Spring

イワヒバ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（宮城県以南）・四国・九州・琉球／朝鮮南部・中国・台湾・熱帯アジア

生 育 地 岩上や樹幹に生える。県北部の山地を中心に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（藤田）

イワヒバ

Selaginella tamariscina (P.Beauv.) Spring

イワヒバ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／東アジアから東南アジア

生 育 地 岩上に生える。県北部の山地を中心に生育する。

選 定 理 由 園芸採取

そ の 他



常陸太田市（内山）

ミズニラ

Isoetes japonica A.Braun

ミズニラ科

茨城県2012 準絶滅危惧
茨城県1997 希少種
環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国／中国・韓国

生 育 地 浅い池や湿地，休耕田などに生える。常陸太田市，常陸大宮市，笠間市，水戸市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸大宮市 (藤田)

ヤシャゼンマイ

Osmunda lancea Thunb.

ゼンマイ科

茨城県2012 準絶滅危惧
茨城県1997 危急種
環境省2012

分 布 北海道 (南部)・本州・四国・九州 (東部) [日本固有種]

生 育 地 溪流沿いに生える。北茨城市，大子町などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



大子町 (内山)

オオキジノオ

Plagiogyria euphlebia (Kunze) Mett.

キジノオシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧
茨城県1997
環境省2012

分 布 本州 (関東と北陸以南)・四国・九州／済州島・中国中南部・台湾・ヒマラヤ・インドシナ・フィリピン

生 育 地 山地の林下に生える。北茨城市，常陸大宮市，土浦市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (藤田)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

アオホラゴケ

Crepidomanes latealatum (Bosch) Copel.

コケシノブ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（東北・関東・北陸）・九州・琉球・小笠原／インドからポリネシアにかけての亜熱帯から熱帯

生 育 地 湿った岩上やコケの生えた樹幹などに生える。県央から県北の沢沿いの岩上に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ハイホラゴケ

Vandenboschia birmanica (Bedd.) Ching

コケシノブ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球・小笠原／東南アジア

生 育 地 岩上などに生える。県内各地の山地部に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

コバノイシカグマ

Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) T.Moore

コバノイシカグマ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（東北南部以南）四国・九州／中国中南部・朝鮮・台湾・南アジア・インドシナ半島・マレーシア西部

生 育 地 山地の林下に生える。最近では県北地域でも確認されている。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

シノブ

Davallia mariesii T.Moore ex Baker

シノブ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道（渡島）・本州・四国・九州・琉球／
朝鮮南部・中国・台湾

生 育 地 岩上や樹幹に着生する。県北地域などに生育
する。

選 定 理 由 森林の伐採，園芸採取

そ の 他



常陸大宮市（藤田）

クモノスシダ

Asplenium ruprechtii Sa.Kurata

チャセンシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国東北部・
ソビエト東部

生 育 地 山地の石灰岩上などに生える。大子町，高鈴
山，常陸大宮市，笠間市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

コタニワタリ

Asplenium scolopendrium L.

チャセンシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 南千島・北海道・本州・四国・九州／樺太・朝鮮・
中国・ソ連～ヨーロッパ・北アメリカ

生 育 地 山地のやや湿った林下に生える。常陸太田市
や笠間市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 本州の北部を除いては，主に日本海側に分布
するものである。



常陸太田市（内山）

絶
滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

マルバベニシダ

Dryopteris fuscipes C.Chr.

オシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（北陸と関東以西）・四国・九州／朝鮮・中国・台湾・インドシナ

生 育 地 山地の林下に生える。生育地は散在している。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



笠間市（内山）

イノデモドキ

Polystichum tagawanum Sa.Kurata

オシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（山形県・関東以西）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地の林下に生える。大子町，常陸太田市，那珂市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

ミヤマワラビ

Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. ex Rydb.

ヒメシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州（祖母山）／北半球の温帯域

生 育 地 夏緑樹林の林下の腐植土の多いところに生える。八溝山，北茨城市，三鈷室山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ウスヒメワラビ

Acystopteris japonica (Luer ss.) Nakai

メシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（東北南部）・四国・九州・屋久島／中国

生 育 地 山地の密な森林中の地上に生える。県北・県央地域の山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

ミヤマシダ

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata var. *glabrum* (Tagawa) Sa.Kurata

メシダ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（近畿以北）・四国（徳島）

生 育 地 山地林下に生える。三鈷室山や北茨城市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ビロードシダ

Pyrrosia linearifolia (Hook.) Ching

ウラボシ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州（南部を除く）・沖縄／台湾・朝鮮・中国

生 育 地 山中陰地の岩上やまれに樹幹に着生して生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ネズミサシ

Juniperus rigida Siebold et Zucc.

ヒノキ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（岩手以南）・四国・九州

生 育 地 陽光の丘陵地や花崗岩地に生える。県北山地、常総市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

シバヤナギ

Salix japonica Thunb.

ヤナギ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東南部～愛知）〔日本固有種〕

生 育 地 浅山丘陵地に生える。県内では加波山、筑波山、石岡市、土浦市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



東海村（内山）

コゴメヤナギ

Salix jessoensis Seemen subsp. *serissifolia* (Kimura) H.Ohashi

ヤナギ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東・中部・近畿）〔日本固有種〕

生 育 地 河川敷などに生える。水戸市、加波山に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



（県博収蔵標本：常総市産）

オノオレカンバ

Betula schmidtii Regel

カバノキ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（中部以北の主として太平洋側）／東北
アジア

生 育 地 岩礫地や土壌の浅い尾根筋に生える。主に県
北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

絶
滅

絶
滅
危
惧
I
A
類

絶
滅
危
惧
I
B
類

絶
滅
危
惧
II
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種

ツクバネガシ

Quercus sessilifolia Blume

ブナ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（宮城・富山以西）・四国・九州

生 育 地 沢沿いの急斜面などに生える。県北山地，筑
波山，神栖市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

ホソバイヌタデ

Persicaria erectominor (Makino) Nakai var. *trigonocarpa* (Makino) H.Hara

タデ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 北海道・本州（関東）／東アジア

生 育 地 水辺に生える。県西地域の河川敷などに生育
する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



境町（内山）

フジナデシコ (ハマナデシコ)

Dianthus japonicus Thunb.

ナデシコ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／中国

生 育 地 海岸に生える。県北から鹿行地域の海岸に生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他



ひたちなか市 (内山)

カワラナデシコ

Dianthus superbus L. var. *longicalycinus* (Maxim.) F.N.Williams

ナデシコ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州

生 育 地 低地や山地の日当たりのよい草原、川原などに生える。県内各地に生育するが、最近生育地の減少が進んでいる。

選 定 理 由 草地の開発、遷移の進行

そ の 他



常陸太田市 (安嶋)

オオヤマフスマ

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

ナデシコ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／北半球の温帯

生 育 地 山地草原に生える。県北，県央，鹿行地域に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



高萩市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

フシグロセンノウ

Silene miqueliana (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai

ナデシコ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地林下に生える。県北，県央地域，筑波山，取手市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市 (内山)

カゴノキ

Litsea coreana H. Lev.

クスノキ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州 (関東・福井以西)・四国・九州/朝鮮

生 育 地 常緑広葉樹林内に生える。県北，鹿行地域や筑波山に生育する。個体数は少ない。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市 (藤田)

イチリンソウ

Anemone nikoensis Maxim.

キンポウゲ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 落葉広葉樹林の林縁や林下，ときには草原にも生える。県北や筑波山，阿見町に生育する。

選 定 理 由 園芸採取，森林の伐採

そ の 他



城里町 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

キクザキイチゲ

Anemone pseudoaltaica H.Hara

キンポウゲ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（近畿以北）

生 育 地 落葉広葉樹林の林縁や林下，ときには草原にも生え，石灰岩地を好む。県北山地や水戸市，筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

アズマイチゲ

Anemone raddeana Regel

キンポウゲ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／アジア東部

生 育 地 落葉広葉樹林の林縁や林下，ときには草原にも生え，石灰岩地を好む。県北山地や筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

コセリバオウレン

Coptis japonica (Thunb.) Makino var. *japonica*

キンポウゲ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（太平洋側）[日本固有種]

生 育 地 針葉樹林の下を好み，スギなどの造林地にも生える。県北山地に育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ミヤマカラマツ

Thalictrum tuberiferum Maxim.

キンポウゲ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／北東アジア

生 育 地 山地帯上部～亜高山帯下部の林地に生える。
県北山地，筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

コウモリカズラ

Menispermum dauricum DC.

ツツラフジ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／アジア北東部

生 育 地 山地林縁などに生える。県北，県央山地や境町に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

マツモ

Ceratophyllum demersum L.

マツモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／世界の温帯～熱帯

生 育 地 池や川に生える。常陸大宮市，土浦市，五霞村に生育する。

選 定 理 由 溜池の埋立，水質の汚濁

そ の 他



霞ヶ浦（福田）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

トモエソウ

Hypericum ascyron L. subsp. *ascyron* var. *ascyron*

オトギリソウ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／アジア東部

生 育 地 山地草原に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (藤田)

ミズオトギリ

Triadenum japonicum (Blume) Makino ex Y.Kimura

オトギリソウ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア

生 育 地 沼地または湿原に生える。県北、県央、鹿行、
県南地域に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発、遷移の進行

そ の 他



笠間市 (内山)

ナガミノツルキケマン

Corydalis raddeana Regel

ケシ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・九州

生 育 地 沢沿いの半日陰のところに生える。県北に生
育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (内山)

ヤマブキソウ

Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig

ケシ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／中国

生 育 地 低地の樹林地に群生する。県北，県央地域，筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

ムカゴネコノメ

Chrysosplenium maximowiczii Franch. et Sav.

ユキノシタ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東・東海）〔日本固有種〕

生 育 地 谷沿いの樹林下に生える。県北，県央地域，加波山，筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

タコノアシ

Penthorum chinense Pursh

ユキノシタ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州・四国・九州・奄美／東アジア

生 育 地 泥湿地，沼，水田，川原などで，水位の変動する場所に多く生える。県内各地に生育する。生育地は限られる。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



日立市（安嶋）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

チョウジザクラ

Cerasus apetala (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Ohba

バラ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（東北地方～広島，主として中央部と太平洋側）・九州（熊本）〔日本固有種〕

生 育 地 落葉樹林下に生える。県内では久慈山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

カワラサイコ

Potentilla chinensis Ser.

バラ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／アジア東部

生 育 地 日当たりのよい川原や砂地に生える。県内では高萩市，日立市，ひたちなか市，神栖市などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修，海岸の開発

そ の 他



常陸大宮市（藤田）

フジキ

Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino

マメ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（太平洋側は福島以南，日本海側は京都以西）・四国／中国

生 育 地 山地に生える。県北地域，鶏足山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

マルバヌスビトハギ

Desmodium podocarpum DC. subsp. *podocarpum*

マメ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／中国・ヒマラヤ・インド

生 育 地 日当たりのよい草地，道ばたなどで平地から低山地まで見られる。美浦村，行方市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

ノアズキ

Dunbaria villosa (Thunb.) Makino

マメ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（宮城以西）・四国・九州・奄美・小笠原／朝鮮・中国

生 育 地 日当たりのよいやや湿った野原や林縁に生える。県内各地に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

レンリソウ

Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.

マメ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・九州／アジア北東部

生 育 地 湿った草地に生える。県北，県央地域，下妻市，常総市に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ミヤマタニワタシ

Vicia bifolia Nakai

マメ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（栃木～愛知）／朝鮮

生 育 地 山地の林下に生える。県内では久慈山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

ノウルシ

Euphorbia adenochlora C.Morren et Decne.

トウダイグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 北海道・本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 湿地に生え、乾燥するとなくなる。県西、県南地域に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



常総市（内山）

フユザンショウ

Zanthoxylum armatum DC. var. *subtrifoliatum* (Franch.) Kitam.

ミカン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・中国

生 育 地 樹林内に生える。県北地域、筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

クログネモチ

Ilex rotunda Thunb.

モチノキ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東・福井以西）・四国・九州・琉球
／東アジア

生 育 地 常緑樹林内に生える。県北，県央地域に生育
する。個体数は少ない。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



土浦市（内山）

ツクバグミ（ニッコウナツグミ）

Elaeagnus montana Makino var. *ovata* (Maxim.) Araki

グミ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（東北・関東・山梨・長野）〔日本固有種〕

生 育 地 落葉樹林内に生える。県北山地や筑波山に生育
する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 和名は筑波山で発見されたことによる（61）。



常陸太田市（内山）

アリアケスミレ

Viola betonicifolia Sm. var. *albescens* (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.

スミレ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 低地のやや湿ったところや路傍に生える。稲
敷市，古河市などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



取手市（藤田）

絶
滅

絶
滅
危
惧
I
A
類

絶
滅
危
惧
I
B
類

絶
滅
危
惧
II
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種

ヒメミソハギ

Ammannia multiflora Roxb.

ミソハギ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／アジア・アフリカ・豪州の熱帯～亜熱帯

生 育 地 水田や湿地に生える。県内では常陸大宮市、日立市、行方市、潮来市、神栖市、つくば市、稲敷市に生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



東海村（内山）

ウスゲチョウジタデ

Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. *greatrexii* (H.Hara) Raven

アカバナ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東以西）・九州・琉球

生 育 地 水田や湿地に生える。ひたちなか市、神栖市に生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



常陸大宮市（内山）

ハナビゼリ

Angelica inaequalis Maxim.

セリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地に生える。県北地域、加波山、筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

シヤク

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

セリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／ユーラシア中北部

生 育 地 山地の湿地に生える。八溝山や日立市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (内山)

ハマボウフウ

Glehnia littoralis F.Schmidt ex Miq.

セリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／東アジア

生 育 地 海岸の砂地に生える。県北，県央，鹿行地域に生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他



ひたちなか市 (内山)

オオバチドメ

Hydrocotyle javanica Thunb.

セリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州 (関東以西)・四国・九州・琉球／アジア東南部・東アフリカ・豪州

生 育 地 山林下の湿った土地に生える。北茨城市，真弓山，御前山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



笠間市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種